

Carta di identità specie animale/vegetale

Nome comune

Verzellino

Nome scientifico

Serinus serinus (Linnaeus, 1766)

Breve descrizione

Il Verzellino è un piccolo passeriforme dall'aspetto paffuto e arrotondato, muniti di testa rotonda, corto becco conico, ali appuntite e coda dalla punta lievemente forcuta. Presenta fronte e nuca giallo-verdastre rigate di bruno-nero, sopracciglio giallo così come il dorso; groppone e parti inferiori giallo-verdastre, rigate di bruno ai fianchi. Ventre biancastro, remiganti e timoniere bruno-neri orlate di verdastro, copritrici alari con puntini chiari.

La femmina è come il maschio, ma meno gialla e più rigata sul petto e sulla testa, e ha il groppone più pallido. I giovani hanno le parti superiori rossastre, rigate di bruno, il groppone pallido rigato, le parti inferiori rossastre rigate di bruno fuorché il ventre e il mento.

Il volo è ondulante e danzante.

Distribuzione

L'areale distributivo di questa specie comprende praticamente tutta l'Europa (ad eccezione delle Isole Britanniche) dalla Spagna ad est fino alle coste meridionali ed orientali del Mar Baltico, alla Bielorussia e alle Crimea, oltre al Nord Africa e al Vicino Oriente. In Italia è pressoché stanziale; in primavera è una presenza che rallegra, con il suo canto, anche i giardini di Civitanova Marche e dintorni.

Biologia ed ecologia

Più comune in pianura e in zone collinari, tuttavia non disdegna le zone montane, laddove sussistano condizioni climatiche con estati asciutte e relativamente calde.

Si nutre di semi di erbe spontanee e di piante di giardino, nonché di semi di essenze arboree. In primavera può cibarsi anche di piccoli insetti (per lo più bruchi). Il canto è vario e gorgheggiato, piuttosto simile a quello dei canarini selvatici. Costruisce un nido minuscolo ma grazioso, su alberelli o nei cesspugli: come materiali utilizza piccole radici, erba, fieno e steli secchi per il rivestimento esterno, mentre internamente lo completa con peli e piume. Ogni coppia realizza due covate all'anno e il periodo degli amori ha inizio verso la metà di aprile: la femmina depone 4-5 minuscole uova bianche finemente punteggiate di e le cova per circa 10-11 giorni. I piccoli abbandonano il nido intorno al 14° giorno. Può essere predato da mustelidi, rapaci e l'onnipresente gatto selvatico. Uova e nidiacei possono essere predati anche da serpenti quali Biacco e Colubro di Esculapio.

Curiosità

Nutrendosi di semi, risente della minaccia dell'intossicazione a causa dei veleni usati in agricoltura (fitofarmaci, pesticidi).

Solitamente il Verzellino maschio canta in volo quando esegue una vera e propria "parata nuziale" con un caratteristico battito d'ali. D'inverno, invece, diventa silenzioso e di conseguenza è molto difficile osservarlo anche per le sue abitudini piuttosto schive.

Fonti biblio-sitografiche da cui sono state tratte le informazioni:

- <https://www.birdingveneto.eu/venezia/guida/verzel/verzel.html>
- <http://www.uccellidaproteggere.it/Le-specie/Gli-uccelli-in-Italia/Le-specie-protette/VERZELLINO>
- https://it.wikipedia.org/wiki/Serinus_serinus

Data di redazione della scheda: 14/06/2020

Autore della scheda: Matteo Magnaterra